



Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	20,6	25,8	2,6	925	,0
2000 - 2004	20,8	25,7	2,5	979	,0
2005 - 2009	21,4	27,1	2,9	795	,0
2008 - 2012	22,2	28,0	3,0	754	4,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,8 Jahre
 2000 - 2004 ,7 Jahre
 2005 - 2009 ,9 Jahre
 2008 - 2012 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	18,8	23,8	3,4	517	,0
2000 - 2004	18,9	23,4	3,3	525	,0
2005 - 2009	22,5	27,9	3,9	432	,0
2008 - 2012	22,2	27,7	4,0	419	4,5

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,7 Jahre
 2000 - 2004 ,8 Jahre
 2005 - 2009 ,9 Jahre
 2008 - 2012 1,2 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 30,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 34,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 32,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	23,0	28,1	4,1	408	,0
2000 - 2004	23,1	28,4	3,9	454	,0
2005 - 2009	20,1	25,8	4,1	363	,0
2008 - 2012	22,1	28,0	4,5	335	4,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,8 Jahre
 2000 - 2004 ,6 Jahre
 2005 - 2009 ,8 Jahre
 2008 - 2012 1,0 Jahre


nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 28,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 39,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 33,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	57,7	72,2	7,0	194	,0
2000 - 2004	62,0	72,9	6,7	200	,0
2005 - 2009	63,9	77,0	7,8	147	,0
2008 - 2012	58,1	70,2	8,5	133	12,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	31,1	37,7	8,9	103	,0
2000 - 2004	34,6	41,2	9,1	104	,0
2005 - 2009	31,9	39,0	9,6	91	,0
2008 - 2012	44,6	54,5	10,0	96	10,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 1,9 Jahre
 2000 - 2004 3,1 Jahre
 2005 - 2009 3,7 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	14,9	18,1	5,7	148	,0
2000 - 2004	12,4	14,9	6,1	113	,0
2005 - 2009	18,8	23,6	7,8	96	,0
2008 - 2012	17,1	20,8	6,5	135	5,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 1,3 Jahre
 2000 - 2004 ,7 Jahre
 2005 - 2009 1,5 Jahre
 2008 - 2012 1,6 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	1,7	2,0	.	351	,0
2000 - 2004	2,6	3,1	1,6	389	,0
2005 - 2009	3,2	3,8	1,8	348	,0
2008 - 2012	2,7	3,3	1,8	298	,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 ,2 Jahre
 2000 - 2004 ,2 Jahre
 2005 - 2009 ,4 Jahre
 2008 - 2012 ,3 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
 Sachsen 1995-2011