



Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	20,7	25,8	2,1	1392	1,7
2002 - 2006	20,3	25,7	2,6	955	,3
2007 - 2011	21,7	27,7	2,9	791	1,3
2012 - 2016	26,2	33,2	3,2	743	5,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 ,7 Jahre
 2002 - 2006 ,7 Jahre
 2007 - 2011 1,0 Jahre
 2012 - 2016 1,2 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	18,5	23,4	2,8	763	1,7
2002 - 2006	18,8	23,6	3,4	494	,2
2007 - 2011	22,1	27,8	3,9	439	1,1
2012 - 2016	23,9	29,9	4,1	412	4,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 ,7 Jahre
 2002 - 2006 ,8 Jahre
 2007 - 2011 1,0 Jahre
 2012 - 2016 1,3 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2015-2016, niedrigster Wert, männlich 24,0
 RKI, BRD 2015-2016, höchster Wert, männlich 42,0
 RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, männlich 32,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	23,4	28,4	3,3	629	1,6
2002 - 2006	21,9	27,9	3,8	461	,4
2007 - 2011	21,3	27,3	4,3	352	1,4
2012 - 2016	29,2	37,4	4,9	331	6,3

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 ,7 Jahre
 2002 - 2006 ,7 Jahre
 2007 - 2011 ,9 Jahre
 2012 - 2016 1,1 Jahre


nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2015-2016, niedrigster Wert, weiblich 29,0
 RKI, BRD 2015-2016, höchster Wert, weiblich 40,0
 RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, weiblich 34,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	59,3	73,2	5,6	300	2,7
2002 - 2006	63,1	75,4	7,1	176	,0
2007 - 2011	59,7	71,6	8,3	134	2,2
2012 - 2016	63,6	81,6	9,4	102	5,9

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 >5,0 Jahre
 2002 - 2006 >5,0 Jahre
 2007 - 2011 >5,0 Jahre
 2012 - 2016 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	31,4	37,6	7,5	146	2,1
2002 - 2006	32,1	39,0	8,9	106	,9
2007 - 2011	41,0	49,7	9,6	100	,0
2012 - 2016	44,7	56,4	9,0	120	6,7

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 2,4 Jahre
 2002 - 2006 3,2 Jahre
 2007 - 2011 4,3 Jahre
 2012 - 2016 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	13,6	16,5	4,7	205	1,0
2002 - 2006	17,0	21,4	7,1	106	,0
2007 - 2011	16,6	20,7	6,7	120	,8
2012 - 2016	29,1	34,4	7,5	143	7,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 1,2 Jahre
 2002 - 2006 ,9 Jahre
 2007 - 2011 1,5 Jahre
 2012 - 2016 2,7 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	2,1	2,5	1,2	531	,8
2002 - 2006	1,5	1,9	1,2	391	,3
2007 - 2011	3,8	4,7	2,1	313	1,6
2012 - 2016	5,3	6,4	2,6	283	3,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2001 ,2 Jahre
 2002 - 2006 ,3 Jahre
 2007 - 2011 ,3 Jahre
 2012 - 2016 ,4 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
 Sachsen 1995-2018