



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	20,6	25,8	2,6	925	,0
2000 - 2004	20,8	25,7	2,5	979	,0
2005 - 2009	21,3	27,0	2,8	794	,0
2009 - 2013	24,1	30,4	3,1	756	10,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,8 Jahre  
 2000 - 2004 ,7 Jahre  
 2005 - 2009 ,8 Jahre  
 2009 - 2013 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	18,8	23,8	3,4	517	,0
2000 - 2004	18,9	23,4	3,3	525	,0
2005 - 2009	22,5	27,9	3,9	432	,0
2009 - 2013	21,7	27,0	4,1	418	8,6

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,7 Jahre  
 2000 - 2004 ,8 Jahre  
 2005 - 2009 ,9 Jahre  
 2009 - 2013 1,2 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 30,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 34,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 32,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	23,0	28,1	4,1	408	,0
2000 - 2004	23,1	28,4	3,9	454	,0
2005 - 2009	19,9	25,5	4,1	362	,0
2009 - 2013	27,3	34,3	4,9	338	13,3


**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,8 Jahre  
 2000 - 2004 ,6 Jahre  
 2005 - 2009 ,8 Jahre  
 2009 - 2013 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 28,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 39,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 33,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	57,7	72,2	7,0	194	,0
2000 - 2004	62,0	72,9	6,7	200	,0
2005 - 2009	63,9	77,0	7,8	147	,0
2009 - 2013	61,0	73,6	8,9	120	21,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2009 - 2013 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	31,1	37,7	8,9	103	,0
2000 - 2004	34,6	41,2	9,1	104	,0
2005 - 2009	31,9	39,0	9,6	91	,0
2009 - 2013	46,2	55,7	9,7	109	19,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 1,9 Jahre  
 2000 - 2004 3,1 Jahre  
 2005 - 2009 3,7 Jahre  
 2009 - 2013 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	14,9	18,1	5,7	148	,0
2000 - 2004	12,4	14,9	6,1	113	,0
2005 - 2009	18,8	23,6	7,8	96	,0
2009 - 2013	21,1	25,3	7,3	144	13,2

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 1,3 Jahre  
 2000 - 2004 ,7 Jahre  
 2005 - 2009 1,5 Jahre  
 2009 - 2013 1,8 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	1,7	2,0	.	351	,0
2000 - 2004	2,6	3,1	1,6	389	,0
2005 - 2009	2,9	3,5	1,8	347	,0
2009 - 2013	3,3	4,1	2,3	293	2,4

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,3 Jahre  
 2009 - 2013 ,3 Jahre

nur Ersterkrankungen

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2011