



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Dünndarmkarzinom (C17)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	37,7	43,8	8,6	122	,8
2002 - 2006	49,2	57,3	8,9	122	,0
2007 - 2011	56,1	66,2	7,4	173	1,7
2012 - 2016	55,0	63,5	6,8	209	6,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 3,0 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	33,8	39,7	11,5	65	,0
2002 - 2006	51,5	61,8	11,9	68	,0
2007 - 2011	51,9	61,4	9,4	108	1,9
2012 - 2016	53,9	64,2	9,7	102	4,9

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 1,5 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, männlich 58,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	42,1	48,2	12,8	57	1,8
2002 - 2006	46,3	51,2	13,3	54	,0
2007 - 2011	63,1	74,2	11,7	65	1,5
2012 - 2016	56,0	62,8	9,4	107	8,4

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 3,8 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, weiblich 60,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Dünndarmkarzinom (C17)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	42,9	48,5	.	7	,0
2002 - 2006	66,7	72,0	.	9	,0
2007 - 2011	75,0	87,2	24,5	12	,0
2012 - 2016	90,6	93,0	.	32	15,6

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 2,9 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	30,0	31,8	.	10	,0
2002 - 2006	62,5	66,4	.	8	,0
2007 - 2011	45,8	52,3	.	24	,0
2012 - 2016	62,5	75,6	15,0	40	2,5

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 ,4 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	22,2	24,8	19,2	18	,0
2002 - 2006	60,9	65,6	.	23	,0
2007 - 2011	68,3	74,7	.	41	,0
2012 - 2016	62,4	70,2	13,7	48	8,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 1,1 Jahre  
 2002 - 2006 >5,0 Jahre  
 2007 - 2011 >5,0 Jahre  
 2012 - 2016 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2001	17,6	20,1	18,1	17	,0
2002 - 2006	31,0	35,4	16,8	29	,0
2007 - 2011	36,1	40,8	15,7	36	,0
2012 - 2016	30,0	33,8	11,6	60	1,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 2001 ,6 Jahre  
 2002 - 2006 2,8 Jahre  
 2007 - 2011 1,4 Jahre  
 2012 - 2016 2,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2018