



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Pankreaskarzinom (C25)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	2,6	3,1	1,6	390	,0
2000 - 2004	4,4	5,3	1,7	589	,0
2005 - 2009	4,6	5,5	1,6	656	,0
2009 - 2013	5,7	7,0	1,8	686	1,6

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,3 Jahre  
 2009 - 2013 ,3 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	3,8	4,4	.	183	,0
2000 - 2004	3,2	3,8	2,0	283	,0
2005 - 2009	2,6	3,0	1,7	313	,0
2009 - 2013	4,2	5,0	2,2	344	1,2

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,3 Jahre  
 2009 - 2013 ,4 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 5,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 11,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 8,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	1,4	1,7	1,6	207	,0
2000 - 2004	5,6	6,3	.	306	,0
2005 - 2009	6,4	7,8	2,6	343	,0
2009 - 2013	7,1	9,0	2,8	342	2,0

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,3 Jahre  
 2005 - 2009 ,3 Jahre  
 2009 - 2013 ,3 Jahre


nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 5,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 13,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 9,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Pankreaskarzinom (C25)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	5,6	6,3	.	36	,0
2000 - 2004	15,6	18,2	.	45	,0
2005 - 2009	16,0	20,6	.	50	,0
2009 - 2013	17,1	22,7	12,5	35	,0

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,5 Jahre  
 2005 - 2009 ,7 Jahre  
 2009 - 2013 ,6 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	6,3	7,3	8,4	32	,0
2000 - 2004	5,2	6,1	4,4	97	,0
2005 - 2009	9,8	11,3	5,1	132	,0
2009 - 2013	13,7	16,4	5,6	150	2,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,8 Jahre  
 2000 - 2004 ,5 Jahre  
 2005 - 2009 ,8 Jahre  
 2009 - 2013 1,2 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	,0	43	,0
2000 - 2004	7,4	7,9	.	54	,0
2005 - 2009	7,3	7,9	.	41	,0
2009 - 2013	3,3	3,6	.	30	3,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,4 Jahre  
 2000 - 2004 ,6 Jahre  
 2005 - 2009 ,7 Jahre  
 2009 - 2013 ,5 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,4	,5	,9	224	,0
2000 - 2004	,9	1,1	1,0	330	,0
2005 - 2009	,3	,3	.	366	,0
2009 - 2013	1,3	1,6	1,1	418	1,2

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,1 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,2 Jahre  
 2009 - 2013 ,2 Jahre

nur Ersterkrankungen

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2011