



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mesotheliom (C45)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	6,3	7,1	.	16	,0
2000 - 2004	14,3	17,0	10,6	42	,0
2005 - 2009	11,1	13,9	7,8	63	,0
2009 - 2013	9,7	11,9	7,6	60	3,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,5 Jahre  
 2000 - 2004 1,1 Jahre  
 2005 - 2009 ,9 Jahre  
 2009 - 2013 ,9 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	10,0	11,1	.	10	,0
2000 - 2004	7,7	9,3	10,2	26	,0
2005 - 2009	10,0	13,0	9,3	40	,0
2009 - 2013	7,5	9,4	8,2	40	5,0


**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 1,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,5 Jahre  
 2005 - 2009 1,2 Jahre  
 2009 - 2013 ,8 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 9,0

RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, männlich 8,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	6	,0
2000 - 2004	25,0	27,8	21,2	16	,0
2005 - 2009	13,0	14,5	.	23	,0
2009 - 2013	15,0	16,9	15,6	20	,0

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,3 Jahre  
 2000 - 2004 1,5 Jahre  
 2005 - 2009 ,6 Jahre  
 2009 - 2013 1,7 Jahre

nur Ersterkrankungen


**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 17,0

RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, weiblich 17,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mesotheliom (C45)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	2	,0
2000 - 2004	25,0	26,9	.	4	,0
2005 - 2009	,0	,0	.	2	,0
2009 - 2013	,0	,0	.	3	,0

mediane Überlebenszeit  
 1995 - 1999 2,0 Jahre  
 2000 - 2004 3,0 Jahre  
 2005 - 2009 1,0 Jahre  
 2009 - 2013 ,4 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	0	.
2000 - 2004	,0	,0	.	1	,0
2005 - 2009	,0	,0	.	4	,0
2009 - 2013	,0	,0	.	2	,0

mediane Überlebenszeit  
 1995 - 1999  
 2000 - 2004 2,3 Jahre  
 2005 - 2009 1,0 Jahre  
 2009 - 2013 1,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	4	,0
2000 - 2004	33,3	39,3	.	6	,0
2005 - 2009	,0	,0	,0	6	,0
2009 - 2013	,0	,0	,0	13	,0

mediane Überlebenszeit  
 1995 - 1999 ,1 Jahre  
 2000 - 2004 3,1 Jahre  
 2005 - 2009 ,7 Jahre  
 2009 - 2013 1,6 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	2	,0
2000 - 2004	,0	,0	,0	11	,0
2005 - 2009	4,2	4,8	.	24	,0
2009 - 2013	5,6	6,9	10,6	18	5,6

mediane Überlebenszeit  
 1995 - 1999 1,0 Jahre  
 2000 - 2004 ,0 Jahre  
 2005 - 2009 ,7 Jahre  
 2009 - 2013 ,8 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:  
Sachsen 1995-2011