



Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Weichteilgewebe ohne Mesotheliom (C46-C49)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	43,9	50,3	5,4	332	6,3
2001 - 2005	50,1	57,0	5,5	315	5,7
2006 - 2010	50,0	57,3	5,3	338	8,6
2011 - 2015	46,0	54,3	5,2	352	21,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 >5,0 Jahre
 2001 - 2005 >5,0 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	44,4	51,9	7,4	177	6,8
2001 - 2005	51,4	58,6	8,1	146	6,2
2006 - 2010	57,0	65,6	7,9	151	11,9
2011 - 2015	51,5	61,7	7,7	169	27,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 >5,0 Jahre
 2001 - 2005 >5,0 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, männlich 55,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, männlich 69,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, männlich 64,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	43,2	48,2	7,8	155	5,8
2001 - 2005	49,0	55,3	7,6	169	5,3
2006 - 2010	44,4	50,6	7,1	187	5,9
2011 - 2015	40,9	47,5	7,1	183	15,3


mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 4,4 Jahre
 2001 - 2005 >5,0 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 4,1 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, weiblich 38,0
 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, weiblich 53,0
 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, weiblich 49,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Weichteilgewebe ohne Mesotheliom (C46-C49)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	61,1	70,6	15,4	39	5,1
2001 - 2005	70,0	78,8	12,7	50	8,0
2006 - 2010	74,3	84,4	.	74	16,2
2011 - 2015	69,7	81,0	10,4	76	36,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 >5,0 Jahre
 2001 - 2005 >5,0 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	50,0	56,2	17,9	30	,0
2001 - 2005	61,9	71,7	17,7	29	3,4
2006 - 2010	63,0	71,1	.	27	3,7
2011 - 2015	59,1	69,4	14,5	44	20,5

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 >5,0 Jahre
 2001 - 2005 >5,0 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	50,0	53,5	.	18	,0
2001 - 2005	26,3	29,1	19,8	19	,0
2006 - 2010	54,5	59,3	.	33	6,1
2011 - 2015	25,3	29,3	12,0	51	7,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 >5,0 Jahre
 2001 - 2005 2,3 Jahre
 2006 - 2010 >5,0 Jahre
 2011 - 2015 2,3 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 2000	12,5	13,8	8,7	56	3,6
2001 - 2005	16,1	18,1	12,9	31	6,5
2006 - 2010	10,5	11,3	.	38	,0
2011 - 2015	21,5	24,6	12,0	46	6,5

mediane Überlebenszeit
 1995 - 2000 ,6 Jahre
 2001 - 2005 1,3 Jahre
 2006 - 2010 ,9 Jahre
 2011 - 2015 1,4 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
 Sachsen 1995-2018