



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Harnblasenkarzinom (C67, D09.0, D41.4)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	60,2	74,1	2,4	1546	,0
2000 - 2004	59,9	73,1	2,0	2226	,0
2005 - 2009	59,6	74,8	1,9	2490	,0
2009 - 2013	58,5	74,0	1,9	2617	12,2

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2009 - 2013 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	61,1	76,0	2,9	1108	,0
2000 - 2004	61,1	75,3	2,4	1617	,0
2005 - 2009	60,7	75,9	2,2	1848	,0
2009 - 2013	58,8	74,5	2,2	1937	13,0

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2009 - 2013 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2005-2006, mittlerer Wert, männlich 75,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	58,0	69,3	4,6	438	,0
2000 - 2004	56,7	67,4	3,9	609	,0
2005 - 2009	56,7	71,6	3,8	642	,0
2009 - 2013	57,6	72,3	3,7	680	10,1

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2009 - 2013 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2005-2006, mittlerer Wert, weiblich 70,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.