



Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Harnblasenkarzinom (C67, D09.0, D41.4)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	59,9	73,8	2,4	1549	,0
2000 - 2004	59,8	73,0	2,0	2220	,0
2005 - 2009	59,7	74,9	1,9	2488	,0
2008 - 2012	58,7	73,8	1,9	2618	14,1

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	60,8	75,7	2,9	1108	,0
2000 - 2004	61,0	75,2	2,4	1612	,0
2005 - 2009	60,8	76,1	2,2	1847	,0
2008 - 2012	59,2	74,5	2,2	1925	13,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2005-2006, mittlerer Wert, männlich 75,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	57,6	68,8	4,6	441	,0
2000 - 2004	56,4	67,1	3,9	608	,0
2005 - 2009	56,6	71,5	3,8	641	,0
2008 - 2012	57,3	71,4	3,7	693	15,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2005-2006, mittlerer Wert, weiblich 70,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.