


Morbus-Hodgkin C81

Durchschnittlich erfasste Erkrankungszahlen

Zeitraum	Geschlecht	N	rohe Rate	altersstandardisierte Rate (ESR)*	arithm. Alter Jahre	medianes Alter Jahre	Vergleich medianes Alter	Vergleichsquelle
2012 - 2016	männlich	65	4,4	4,5	48,3	46,3	46,5	RKI, BRD 2013-2014
	weiblich	28	1,8	1,9	50,0	48,7	43,5	

* europastandardisierte Rate



Anzahl Neuerkrankungen



Absolute Neuerkrankungen und Neuerkrankungsraten je 100.000 Einwohner

Jahr	absolut männlich	absolut weiblich	Rohe Rate männlich	Rohe Rate weiblich	Stand. Rate männlich	Stand. Rate weiblich
2017	7	7	2,4	2,3	2,0	1,9
2016	15	3	5,1	1,0	6,2	,9
2015	10	6	3,4	1,9	3,3	2,3
2014	10	5	3,4	1,6	3,7	2,3
2013	17	8	5,8	2,6	5,9	2,3
2012	13	6	4,4	1,9	3,2	1,6
2011	15	8	5,0	2,5	5,1	2,9
2010	8	11	2,6	3,4	1,7	4,3
2009	11	9	3,5	2,7	3,2	3,8
Ø95-08	8	8	2,5	2,1	2,4	2,1

Stand. Rate = Europastandard



Vergleichswerte

RKI, BRD 2014, männlich	3,4
RKI, Sachsen 2003-2004, männlich	2,1
RKI, BRD 2014, weiblich	2,5
RKI, Sachsen 2003-2004, weiblich	1,8

Vergleichswerte

RKI, BRD 2014, männlich	3,1
RKI, Sachsen 2003-2004, männlich	2,0
RKI, BRD 2014, weiblich	2,4
RKI, Sachsen 2003-2004, weiblich	1,7





Tumorzentrum Zwickau Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Zwickau
Morbus-Hodgkin C81

Zahl der Neuerkrankungen nach Stadt-/Landkreisen

Tumorzentrum Zwickau	absolut männlich					absolut weiblich				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
Erzgebirgskreis (anteilig 33,1%)	2	2	3	4	3	1	0	0	2	1
Vogtlandkreis	3	6	4	1	11	2	2	1	3	4
Zwickau (anteilig 78,3%)	2	7	3	5	3	4	1	5	0	3

Neuerkrankungsrate nach Stadt-/Landkreisen (n/100.000 Einwohner), altersstandardisiert (ESR)


Region	Stand. Rate männlich					Stand. Rate weiblich				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
Erzgebirgskreis	3,2	4,1	4,6	8,0	3,6	3,3	,0	,0	4,8	2,1
Vogtlandkreis	2,7	7,0	3,1	,5	11,3	,5	1,7	1,2	3,7	2,7
Zwickau	,9	6,3	3,0	4,6	1,9	2,6	,7	4,4	,0	2,1




Morbus-Hodgkin C81

Diagnosejahre 2012 bis 2016

Neuerkrankungen/Jahr nach Altersgruppen



Neuerkrankungen/100.000 EW nach Altersgruppen



Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O)


ICD-O	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C77.8	Lymphknoten mehrerer Regionen	61	93,8	27	96,4	88	94,6
C77.9	Lymphknoten o.n.A.	3	4,6	1	3,6	4	4,3
C77.0	Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	1	1,5	0	.	1	1,1
	Gesamt	65	69,9	28	30,1	93	.

Histologische Häufigkeitsverteilung

Bezeichnung	M-Code	N	%	% gesamt
Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierender Typ o.n.A.	9663/3	31	33,3%	33,3%
Hodgkin-Lymphom, gemischtzellige Form o.n.A.	9652/3	28	30,1%	30,1%
Hodgkin-Lymphom o.n.A.	9650/3	16	17,2%	17,2%
Hodgkin-Lymphom, nodulärer lymphozytenprädominanter Typ	9659/3	9	9,7%	9,7%
Hodgkin-Lymphom, lymphozytenreich	9651/3	7	7,5%	7,5%
sonstige maligne Histologien		2	2,2%	2,2%
maligne Histologien gesamt		93		100%

Ann Arbor Stadium


Jahr	I	II	III	IV	k.A.	gesamt
1995-2012	45	113	69	64	14	305
2013	3	12	4	4	2	25
2014	3	7	2	2	1	15
2015	2	4	6	4	0	16
2016	1	7	6	4	0	18
2017	3	3	4	3	1	14
gesamt	57	146	91	81	18	393
%	15	37	23	21	5	100



Morbus-Hodgkin C81

Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

Jahr	RTsT	sT	RT	k.A.*1	k.A.*2	gesamt	RTsT %
2012	5	9	0	5	0	19	26,3
2013	14	6	1	4	0	25	56,0
2014	10	4	1	0	0	15	66,7
2015	5	8	0	3	0	16	31,3
2016	12	6	0	0	0	18	66,7
gesamt	46	33	2	12	0	93	49,5
%	49	35	2	13	0	100	.



sT = systemische Therapie

RT = Strahlentherapie

k.A. = keine Angabe

k.A.*1 = keine tumorspezifische Therapie, jedoch histologisch gesichert

k.A.*2 = keine tumorspezifische Therapie, nur klinische Sicherung des Tumors

Diagnosejahre
2012 bis 2016

Systemische Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

Beschreibung	Typ	Anzahl	%
Bleomycin, Dacarbazin, Doxorubicin, Vinblastin	C	45	57,0
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Mesna, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	32	40,5
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Mesna, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	6	7,6
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	5	6,3
Dexamethason	C	5	6,3
Prednison, Vincristin	C	4	5,1
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Filgrastim, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	3	3,8
Dacarbazin, Doxorubicin, Vinblastin	C	2	2,5
Doxorubicin, Etoposid, Prednison, Vincristin	C	2	2,5
Cyclophosphamid, Prednison, Vincristin	C	1	1,3
Cyclophosphamid, Doxorubicin, Prednison, Vincristin	C	1	1,3
Cisplatin, Cytarabin, Dexamethason	C	1	1,3
Gemcitabin	C	1	1,3
Vinblastin	C	1	1,3
Bendamustin	C	1	1,3
Medikament o. n. A.	C	1	1,3
Dexamethason, Vincristin	C	1	1,3
Cyclophosphamid, Dexamethason	C	1	1,3
Cyclophosphamid, Dacarbazin, Doxorubicin, Etoposid, Prednison, Vincristin	C	1	1,3
Doxorubicin, Gemcitabin, Prednison, Vinblastin	C	1	1,3
Rituximab	I	3	3,8
Brentuximab vedotin	I	1	1,3
gesamt Anzahl der Fälle		79	.

Protokolltyp:

CM – Monochemoth.

CP – Polychemoth.

C – Chemotherapie o.n.A.

IC – Immun-/Chemoth.

H – Hormontherapie

I – Immuntherapie

IU – unspezif. Immunth.

IS – spezif. Immunth.

gesamt = Anzahl der therapierten Fälle; Mehrfachnennungen von Therapien sind pro Fall möglich; Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil an den systemisch therapierten Gesamtfällen

*Bei Eintritt eines Rezidivs werden weitere Therapien nicht ausgewiesen.


Morbus-Hodgkin C81

Diagnosejahre
2008 bis 2013

5-Jahres-Überleben nach Ann Arbor-Stadium

Stadium	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
Ann Arbor I	92,3	95,7	.	13	7,7
Ann Arbor II	95,6	95,7	.	45	22,2
Ann Arbor III	58,0	65,3	19,9	24	4,2
Ann Arbor IV	73,7	75,3	.	19	5,3

nur Ersterkrankungen




mediane Überlebenszeit

Ann Arbor I >5,0 Jahre
 Ann Arbor II >5,0 Jahre
 Ann Arbor III >5,0 Jahre
 Ann Arbor IV >5,0 Jahre

Überleben gesamt, männlich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	89,1	89,5	7,6	64	,0
2	84,4	86,9	8,9	.	,0
3	81,3	86,2	9,6	.	,0
4	79,7	86,5	9,9	.	,0
5	74,7	82,4	10,7	.	15,6

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)


RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 63,0

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2011

weiblich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	93,0	93,5	7,6	43	,0
2	90,7	91,7	8,7	.	,0
3	88,4	90,2	9,6	.	,0
4	86,0	89,1	10,4	.	,0

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 72,0